



*Faglige kontakter under eksamen:*

Turid Follestad 98066880

Jo Eidsvik 90127472

Mette Langaas 98847649

## EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK

Fredag 19.mai 2006

Tid: 09:00–13:00

*Tillatte hjelpemidler:*

Gult A5-ark med egne håndskrevne notater.

*Tabeller og formler i statistikk* (Tapir Forlag).

K. Rottmann: *Matematisk formelsamling*.

Kalkulator: HP30S.

BOKMÅL

Sensur: 14.juni 2006.

### Oppgave 1 Feil på mobilnett

La tiden  $X$  (målt i uker) mellom to påfølgende feil i et mobilnett være en kontinuerlig stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet

$$f(x) = \beta x^{-\beta-1}, \quad x > 1, \beta > 1.$$

- a) Vis at den kumulative fordelingsfunksjonen,  $F(x)$ , for  $X$  er  $F(x) = 1 - x^{-\beta}$ , for  $x > 1$ .

Anta i resten av dette punktet at  $\beta = 3$ .

Hva er sannsynligheten for at det tar mer enn 2 uker mellom to påfølgende feil?

Dersom det er gått 2 uker siden sist det var en feil på nettet, hva er sannsynligheten for at det svikter innen det er gått 3.5 uker fra siste feil?

Vi vil estimere parameteren  $\beta$  basert på data for tidligere tilfeller av feil på nettet. La  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, n$  være lengden på  $n$  tidsintervaller (målt i uker) mellom to påfølgende feil. Vi antar at  $X_1, X_2, \dots, X_n$  er uavhengige og identisk fordelte stokastiske variabler, med sannsynlighetstetthet  $f(x)$  som gitt i starten av oppgaven.

Tre alternative estimatorer for  $\beta$  er

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}, \quad \hat{\beta}_2 = \frac{n-1}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)} \quad \text{og} \quad \hat{\beta}_3 = \frac{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}{n},$$

der  $\ln$  er den naturlige logaritmen.

- b) Hvilken av estimatorene over er sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren (SME)? Begrunn svaret ved å utlede SME. Beregn estimatet når  $n = 10$  og de observerte verdiene er som følger:

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ | $x_{10}$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1.23  | 2.04  | 1.27  | 1.79  | 1.10  | 1.29  | 2.74  | 1.15  | 1.10  | 1.06     |

Det oppgis at  $\sum_{i=1}^{10} \ln(x_i) = 3.39$ .

- c) Vis at  $2\beta \ln(X_i)$  er kjikvadratfordelt med 2 frihetsgrader, og videre at  $2\beta \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$  er kjikvadratfordelt med  $2n$  frihetsgrader.

Utleid et 95% konfidensintervall for  $\beta$ . Hva blir intervallet når dataene er som i punkt b)?

## Oppgave 2      Transport av masse

En entreprenør har leid inn et transportfirma til å transportere masse bort fra en byggeplass. Det er to mulige veivalg fra byggeplassen til stedet der massen skal deponeres, gjennom eller utenom bykjernen. Av helse, miljø og sikkerhetshensyn velger entreprenøren at massen skal transporteres utenom bykjernen.

Når oppdraget er ferdig har transportfirmaet kjørt 1000 turer, og transportfirmaet informerer entreprenøren om at av de 1000 turene har 5 blitt kjørt gjennom bykjernen og 995 er blitt kjørt utenom bykjernen.

I løpet av transportperioden har entreprenøren ved 5 tilfeldig valgte transporter sjekket om transporten har skjedd gjennom bykjernen. La  $X$  være antall ganger, av de 5 transportene som ble sjekket, entreprenøren finner at massen er blitt transportert gjennom bykjernen.

Hvilken fordeling har  $X$ ? Begrunn svaret.

Hvilken verdi av  $X$  har høyest punktsannsynlighet?

Nå viser det seg at entreprenøren fant at i 5 av de 5 tilfellene han sjekket så ble massen transportert gjennom bykjernen. Hva er sannsynligheten for dette, dvs.  $P(X = 5)$ ?

**Oppgave 3 Trykkfasthet av murblokker**

Ved en bedrift produseres en spesiell type murblokker, og vi skal i denne oppgaven se på trykkfastheten,  $Y$ , til murblokkene. Med trykkfasthet menes det maksimale trykket en murblokk kan utsettes for uten at den skades. Anta at  $Y$  er normalfordelt med forventningsverdi  $\mu = E(Y)$ , gitt i MPa ( $10^6$  Pascal), og standardavvik  $\sigma = SD(Y) = 0.21$  MPa.

a) Anta i dette punktet at  $\mu = 2.10$  MPa.

Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt murblokk har en trykkfasthet som er høyere enn 1.83 MPa, dvs.  $P(Y > 1.83)$ ?

Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt murblokk har en trykkfasthet som avviker mindre enn 0.3 MPa fra forventningsverdien  $\mu = 2.10$  MPa?

Vi ser på måling av trykkfasthet for  $n = 24$  tilfeldig valgte murblokker fra produksjonen. Hva er sannsynligheten for at den minste målingen vil være lavere enn 1.83 MPa?

Bedriften har startet produksjon av en ny type murblokker, som de mener har forventet trykkfasthet  $\mu = 2.40$  MPa. Anta at det er kjent at standardavviket til trykkfastheten til de nye murblokkene er  $\sigma = 0.21$  MPa. Bedriften ønsker å undersøke om det er grunn til å tro at forventet trykkfasthet for den nye typen murblokker er lavere enn 2.40 MPa.

b) Formulér dette som en hypotesetest ved å definere nullhypotese og alternativ hypotese.

Sett opp en testobservator og finn forkastningsområdet til testen, når vi ønsker å benytte signifikansnivå  $\alpha = 0.05$ .

Hva blir konklusjonen på testen, når vi har observert trykkfasthet til  $n = 24$  murblokker, og gjennomsnittlig trykkfasthet ble 2.30 MPa?

Bestem teststyrken til den alternative hypotesen  $H_1 : \mu = 2.30$  MPa for signifikansnivå 0.05 og  $n = 24$  observasjoner.

**Oppgave 4 Hubble**

En viktig vitenskapelig oppdagelse fant sted i 1929 da Edwin Hubble oppdaget at universet er ekspanderende. Hubble's tallmateriale bestod blant annet av;  $x_i$  = avstanden til galakse  $i$  (målt i millioner lysår), og  $y_i$  = hastigheten til galakse  $i$  (målt i 1000 km/s). Verdiene Hubble benyttet i en av sine analyser er som følger:

| Navn            | Avstand, $x_i$ | Hastighet, $y_i$ |
|-----------------|----------------|------------------|
| Virgo           | 22             | 1.2              |
| Pegasus         | 68             | 3.8              |
| Perseus         | 108            | 5.1              |
| Coma Berenices  | 137            | 7.5              |
| Ursa Major 1    | 255            | 14.9             |
| Leo             | 315            | 19.2             |
| Corona Borealis | 390            | 21.4             |
| Gemini          | 405            | 23.0             |
| Bootes          | 685            | 39.2             |
| Ursa Major 2    | 700            | 41.6             |
| Hydra           | 1100           | 60.8             |

Det oppgis her at  $\sum_{i=1}^{11} x_i = 4185$ ,  $\sum_{i=1}^{11} y_i = 237.7$ ,  $\sum_{i=1}^{11} x_i^2 = 2685141$  og  $\sum_{i=1}^{11} x_i y_i = 152220$ .

Hubble foreslo en modell for hastighet som funksjon av avstand på formen  $y = \beta x$ , der  $\beta$  senere har blitt kalt Hubble's konstant. En statistisk versjon av ligningen kan gis ved:

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 11, \quad (1)$$

der  $\varepsilon_i$ ,  $i = 1, \dots, 11$ , er uavhengige og normalfordelte stokastiske variabler med forventning 0 og varians  $\sigma^2$ .

- a) Vi vil i første omgang finne en estimator for  $\beta$ .

Bruk minste kvadraters metode (method of least squares) til å estimere  $\beta$  med utgangspunkt i ligning (1), og vis at estimatoren for  $\beta$  da blir gitt ved  $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^{11} x_i Y_i}{\sum_{i=1}^{11} x_i^2}$ . Regn ut estimatet for  $\beta$  basert på dataene over.

Finn også forventning og varians til  $\hat{\beta}$ .

- b) Anta at en annen galakse befinner seg en avstand  $x_0 = 900$  millioner lysår borte.

Finn predikert hastighet,  $\hat{y}_0$ , til denne galaksen.

Utledd et 95% prediksjonsintervall for en måling av hastigheten til denne galaksen. Det oppgis at  $\sum_{i=1}^{11} (y_i - \hat{y}_i)^2 = 9.87$ , der  $\hat{y}_i = \hat{\beta} x_i$ .