

Referansegruppe

- MTBYGG: Marie Helene Bjørndal
- MTMT: Erlend Sverdrup
- MTTEKGEO: Haakon J. Haugerud

Gje innspel!

Kap 3: Stokastiske variable og sannsynsfordelingar

- Stokastisk variabel (3.1): **1 dag**
- Diskret sannsynsfordeling (3.2): **1 dag**
- Kontinuerleg sannsynsfordeling (3.3): **1 dag**
- Kummulativ sannsynsfordeling (3.2 og 3.3): **1 dag**
- Diskret simultanfordeling (3.4) **Torsdag**
- Kontinuerleg simultanfordeling (3.4) **Torsdag**
- Marginal sannsynsfordeling (3.4) **Torsdag**
- Betinga sannsynsfordeling (3.4) **Torsdag**
- Statistik uavhengig (3.4) **Fredag**

Stokastisk variabel (Def. 3.1)

Ein *stokastisk variabel* er ein funksjon som assosierer eit reelt tal med kvart element i utfallsrommet. $X : S \rightarrow \mathbb{R}$

Notasjon:

- X, Y : Store bokstavar på stokastiske variable
- x, y : Små bokstavar på utfall (datapunkt)

- Parallell (parallell 1, parallell 2, parallell 3)
- Kjønn (mann, kvinne, annet)
- Høgde
- Skonummer

Diskret og kontinuerlege stokastiske variable

Diskret stokastisk variabel: (Def. 3.2)

Dersom den stokastiske variabelen gjev telbart antall utfall.

Kontinuerleg stokastisk variabel: (Def. 3.3)

Dersom den stokastiske variabelen har utfall på kontinuerleg skala.

Definisjon

Paret $(x, f(x))$ blir kalla sannsynsfordelinga til den diskret stok. var. X dersom

- $0 \leq f(x)$
- $\sum_{\forall x} f(x) = 1$ (summen over alle moglege x)
- $f(x) = P(X = x)$

Definisjon 3.4.

Funksjonen $f(x)$ definert for alle reelle tal $x \in \mathbb{R}$ blir kalla sannsynsfordelinga til den kontinuerlege stok. var. X

- $0 \leq f(x)$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Definisjon 3.5 og 3.7

Den *kummulative fordelingsfunksjonen* $F(x)$ for ein stok. var. X er:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- *Diskret:* $F(x) = \sum_{t \leq x} f(t)$
- *Kontinuerleg* $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

Kap 3: Stokastiske variable og sannsynsfordelingar

- Stokastisk variabel: $X : S \rightarrow \mathbb{R}$
- Diskret sannsynsfordeling: $f(x)$ slik at $P(X = x) = f(x)$
- Kontinuerleg sannsynsfordeling:
 - $f(x)$ slik at $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)$
 - Sannsyn = areal under $f(x)$
- Kummulativ sannsynsfordeling: $F(x)$ slik at $P(X \leq b) = F(b)$
- Diskret simultanfordeling
- Kontinuerleg simultanfordeling
- Marginal sannsynsfordeling:
- Betinga sannsynsfordeling
- Statistikk uavhengig

Referansegruppe

- MTBYGG: Marie Helene Bjørndal
- MTMT: Erlend Sverdrup
- MTTEKGEO: Haakon J. Haugerud

Gje innspel!