

Viktige omgrep

- Forventningsverdi
- Varians / standard avvik
- Kovarians / korrelasjon

Viktige reknereglar

Forventning til lineærkombinasjon:

Varians til lineærkombinasjon:

Definisjon 4.1

La X vere ein stok.var. med sannsynsfordeling $f(x)$.
Forventningsverdien til X er då

$$\mu = E(X) = \sum_{\forall x} xf(x)$$

dersom X er diskret, og

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

dersom X er kontinuerleg.

Teorem 4.1

For ein funksjon $g(X)$;

$$\mu_{g(X)} = E(g(X)) = \sum_x g(x)f(x)$$

for diskret X , og

$$\mu_{g(X)} = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

for kontinuerleg X .

Har: $Y = g(X)$

Ønsker: $E(Y)$

Generelt:

$$E(Y) \neq g(E(X))$$

...only the hard way...

Må bruke definisjonen på forventning for funksjon av stok.var. Kan evt. approksimere vha Taylorrekker (jf Ex 4.24 og 4.25). Eller **simulere**.

Er interessert i kostnaden på leigebil i ferien.

Pris:

- Fast pris: $a = 500 \text{ €}$
- Km pris: $b = 0.2 \text{ €/ km}$

Her ei sannsynsfordeling $f(x)$ på lengda X som skal kjørast.

- $E(X) = 2000 \text{ km}$
- $\text{Var}(X) = (500 \text{ km})^2$

Kostnad

$$Y = a + bX$$

Teorem 4.5

Dersom a og b er konstantar og X ein stok. var., så er

$$E(a + bX) = a + bE(X)$$

Eksempel, berehjelp for mormor 1

Eg er med mormor på butikken som berehjelp. Hor mykje må eg bere?

Ho kjøper:

- alltid 2 liter melk ($a = 2kg$)
- X pakkar mjøl, kvar på $b = 2kg$
- Y pakkar sukker, kvar på $c = 1kg$

Veit at:

- $E(X) = \mu_X = 1.5$ og $Var(X) = \sigma_X^2$
- $E(Y) = \mu_Y = 2$ og $Var(Y) = \sigma_Y^2$

Totalt å bere:

$$Z = a + bX + cY$$

Definisjon 4.2

La X og Y vere to stokastiske variable med simultanfordeling $f(x, y)$, og $g(x, y)$ ein funksjon. Då er dersom diskre

$$\mu_{g(X,Y)} = E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) f(x, y)$$

dersom kontinuerleg

$$\mu_{g(X,Y)} = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

Teorem 4.7

La X og Y vere to stokastiske variable, og $g(x, y)$ og $h(x, y)$ to funksjonar. Då er

$$E[g(X, Y) + h(X, Y)] = E[g(X, Y)] + E[h(X, Y)]$$

Korrolar 4.3

$$E[g(X) + h(Y)] = E[g(X)] + E[h(Y)]$$

Forventning av lineærkombinasjon

La X og Y vere to stokastiske variable, og a , b og c konstantar. Då er

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

Bevis: korrolar 4.3 + teorem 4.5

Kap 4: Matematisk forventning

Viktige omgrep

- Forventningsverdi: Diskret: $\mu = E(X) = \sum_{\forall x} xf(x)$
Kont: $\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$
- Varians / standard avvik
- Kovarians / korrelasjon

Viktige reknereglar

Forventning til lineærkombinasjon:

$$E(a_0 + a_1X_1 + \dots + a_nX_n) = a_0 + a_1E(X_1) + \dots + a_nE(X_n)$$

Varians til lineærkombinasjon: