


Kapittel 3: Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger



TMAA4240 Statistikk (F2 og E7)

3.4: Foreleses mandag 30.august





Ole.Peter.Lodoen@math.ntnu.no – p.1/16

Oppsummering 3.1-3.3

Diskret stokastisk variabel	Kontinuerlig stokastisk variabel
X	X
Mulige verdier x : Endelig eller tellbart mange	Mulige verdier x : Intervall eller hele R
Eksempel: $\{0, 1, \dots, n\}$	Eksempel: $[0, 1]$ eller $[0, \infty)$
Sannsynlighetsfordeling: $f(x) = P(X = x)$ for alle mulige x	Sannsynlighetsfordeling: $f(x)$ definert for alle reelle x ved $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$
	

Oppsummering 3.1-3.3, forts.

Diskret stokastisk variabel	Kontinuerlig stokastisk variabel
Kumulativ fordeling: $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$ definert for alle reelle x	Kumulativ fordeling: $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ definert for alle reelle x
	
$P(a < X \leq b) = \sum_{x \in (a,b]} f(x)$ $= F(b) - F(a)$	$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ $= F(b) - F(a)$
Hvis mulige verdier er heltall: $f(x) = F(x) - F(x - 1)$	Hvis f er kontinuertlig i x : $f(x) = F'(x)$

Simultanfordeling, $f(x, y)$

DEF 3.8: Funksjonen $f(x, y)$, er simultanfordelingen til to diskrete stokastiske variable X og Y , dersom

1. $f(x, y) \geq 0$ for alle (x, y)
2. $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$
3. $P(X = x \cap Y = y) = P(X = x, Y = y)$ (punktsannsynlighet)

For enhver region A is xy -rommet så er $P[(X, Y) \in A] = \sum_A \sum f(x, y)$.

DEF 3.9: Funksjonen $f(x, y)$, er simultan sannsynlighetstetthet til to kontinuertlige stokastiske variable X og Y , dersom

1. $f(x, y) \geq 0$ for alle (x, y)
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dxdy = 1$
3. $P[(X, Y) \in A] = \int_A \int f(x, y)dxdy$ for enhver region A i (x, y) -planet.

Kast med to terninger

Definerer:

- X = maksimum antall øyne
- Y = absolutverdi av differanse i antall øyne

Utfallsrom og verdier av X og (Y) (i parentes)

	1	2	3	4	5	6
1	1 (0)	2 (1)	3 (2)	4 (3)	5 (4)	6 (5)
2	2 (1)	2 (0)	3 (1)	4 (2)	5 (3)	6 (4)
3	3 (2)	3 (1)	3 (0)	4 (1)	5 (2)	6 (3)
4	4 (3)	4 (2)	4 (1)	4 (0)	5 (1)	6 (2)
5	5 (4)	5 (3)	5 (2)	5 (1)	5 (0)	6 (1)
6	6 (5)	6 (4)	6 (3)	6 (2)	6 (1)	6 (0)

Kast med to terninger (forts.)


Utfallsrom og verdier av X og (Y) (i parentes)

	1	2	3	4	5	6
1	1 (0)	2 (1)	3 (2)	4 (3)	5 (4)	6 (5)
2	2 (1)	2 (0)	3 (1)	4 (2)	5 (3)	6 (4)
3	3 (2)	3 (1)	3 (0)	4 (1)	5 (2)	6 (3)
4	4 (3)	4 (2)	4 (1)	4 (0)	5 (1)	6 (2)
5	5 (4)	5 (3)	5 (2)	5 (1)	5 (0)	6 (1)
6	6 (5)	6 (4)	6 (3)	6 (2)	6 (1)	6 (0)

Simultan sannsynlighetsfordeling


	1	2	3	4	5	6
0	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36
1	0	2/36	2/36	2/36	2/36	2/36
2	0	0	2/36	2/36	2/36	2/36
3	0	0	0	2/36	2/36	2/36
4	0	0	0	0	2/36	2/36
5	0	0	0	0	0	2/36

Simultanfordeling



TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 3.4 – p.7/16



Høyde og vekt av studenter



TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 3.4 – p.8/16

Elektroniske komponenter

- Levetiden til to elektriske komponenter, X og Y :
- $f(x, y) = e^{-(x+y)}$ for $x > 0$ og $y > 0$ og 0 ellers.



TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 3.4 – p.9/16

Marginalfordelinger

DEF 3.10: Marginalfordelingen for X alene og for Y alene er

- for det diskrete tilfellet:

$$g(x) = \sum_y f(x, y) \quad \text{og} \quad h(y) = \sum_x f(x, y)$$

- og for det kontinuerlige tilfellet:

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad \text{og} \quad h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

Kast med to terninger (igjen)

- X = maksimum antall øyne
- Y = absoluttverdi av differanse i antall øyne
- Simultan sannsynlighetsfordeling

	1	2	3	4	5	6	$h(y)$
0	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	1/36	6/36
1	0	2/36	2/36	2/36	2/36	2/36	10/36
2	0	0	2/36	2/36	2/36	2/36	8/36
3	0	0	0	2/36	2/36	2/36	6/36
4	0	0	0	0	2/36	2/36	4/36
5	0	0	0	0	0	2/36	2/36
$g(x)$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36	36/36

Betingede fordelinger

DEF 3.11: La X og Y være to stokastiske variable, diskrete eller kontinuerlige.

- Den betingede fordelingen for den stokastiske variablen Y gitt at $X = x$ er

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{g(x)}, \quad g(x) > 0$$

- Den betingede fordelingen for den stokastiske variablen X gitt at $Y = y$ er

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{h(y)}, \quad h(y) > 0$$

Uavhengighet

DEF 3.12: La X og Y være to stokastiske variable, diskrete eller kontinuerlige, med simultan sannsynlighetsfordeling $f(x, y)$, og marginale fordelinger $g(x)$ og $h(y)$. Da er X og Y *uavhengige* hvis og bare hvis

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$$

for alle (x, y) .

DEF 3.13: La $X_1, X_2, \dots, X_n$ være n stokastiske variable, diskrete eller kontinuerlige, med simultan sannsynlighetsfordeling $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, og marginale fordelinger $f_1(x_1), f_2(x_2), \dots, f_n(x_n)$. Da er $X_1, X_2, \dots, X_n$ innbyrdes *uavhengige* hvis og bare hvis

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdots f_n(x_n)$$

for alle $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Togforsinkelsen, forts.

La X (minutter) betegne togets forsinkelse på en tilfeldig valgt hverdag. Vi antar at X er en stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet

$$g(x) = \begin{cases} kxe^{-2x} & \text{for } x > 0 \\ 0 & \text{for } x \leq 0 \end{cases}$$

der $k > 0$ er en konstant.


La Y (minutter) være den tiden toget står på stasjonen. Oppholdstiden Y vil være influert av forsinkelsen, og vi antar at den betingede sannsynlighetstetthet $f(y|x)$ for Y , gitt at forsinkelsen X er lik x (> 0), er gitt ved

$$f(y|x) = \begin{cases} (x/2) e^{-xy/2} & \text{for } y > 0 \\ 0 & \text{for } y \leq 0 \end{cases}$$


- iii) Sett opp simultantettheten $f(x, y)$ for X og Y .
- iv) Finn sannsynlighetstettheten $h(y)$ for oppholdstiden Y .

Togforsinkelsen: fordelinger


$$f(y|x)$$




$$f(x, y)$$



$$g(x)$$




$$h(y)$$



TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 3.4 – p.15/16

Oppsummering 3.4

Funksjonen $f(x, y)$, er simultan sannsynlighetsfordeling for X og Y .



Marginalfordelinger:

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_y f(x, y) & \text{og} & \quad h(y) = \sum_x f(x, y) & \text{diskret} \\ g(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy & \text{og} & \quad h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx & \text{kontinuerlig} \end{aligned}$$

Betingede fordelinger:

$$\begin{aligned} f(y|x) &= f(x, y)/g(x), & g(x) &> 0 \\ f(x|y) &= f(x, y)/h(y), & h(y) &> 0 \end{aligned}$$

Uavhengighet: X og Y uavhengige hvis og bare hvis

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y) \quad \text{for alle } (x, y).$$