


Kapittel 6: Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger

TMA4240 Statistikk (F2 og E7)

6.6-6.10: foreleses mandag 20. sept, 2004.



Basert på slides av Mette Langaas – p.1/8


Ventetider i Poisson-prosess

- $X =$ Antall hendelser i intervallet $[0, t]$ er Poisson-fordelt

$$p(x; \lambda t) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}, \quad x = 0, 1, \dots$$

- Antall hendelser som inntreffer i to disjunkte intervall er uavhengige.
- Hendelsene i et intervall er uavhengige og uniformt fordelt over intervallet.
- Hvilken fordeling har ventetidene mellom to hendelser?

Gammafordelingen




TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 6 – p.3/8

$E[X]$ for gammafordeling


$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int x f(x) dx \\
 &= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} x^{(\alpha+1)-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\
 &= \frac{\beta^{\alpha+1} \Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{1}{\beta^{\alpha+1} \Gamma(\alpha+1)} x^{(\alpha+1)-1} e^{-\frac{x}{\beta}} dx}_{=1} \\
 &= \beta \frac{\alpha \Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha \beta.
 \end{aligned}$$

Ekspponential fordeling


Ekspponential beta= 1




f(gamma) alpha= 1 beta= 2



f(gamma) alpha= 1 beta= 4



Ekspponential beta= 10



TMA4240 (F2 og E7): Kapittel 6 – p.5/8

Tid til n te hendelse

- Lyspærer: Jeg kjøper en pakke med 10 lyspærer til stekeovnen min. Hvor lang tid holder de?
- Upersonlig epost (spam og reklame): Hvor lang til går det til jeg får 100 upersonlige eposter?
- Trafikk-kontroll: Foto-boks står montert i Vålerenga tunnelen. Den kan ta 36 bilder (?). Hvor langt tid tar det før veivesenet bør skifte film?
- Promillekontroll: Hvor lenge må politiet stå på post før de har fått 5 personer som har blåst rødt?

Vi kan ofte anta at disse er Poisson prosesser.

6.8 Kjikvadrat fordelingen

(mer fullstendig sammen med Kapittel 8.)

DEF En kontinuerlig S.V. X er kji-kvadrat fordelt med parametere ν (kalt frihetgrader), hvis sannsynlighetstettheten er gitt ved

$$f(x; \nu) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

hvor ν er et positivt heltall.

Kji-kvadrat vs. gamma: Kji-kvadrat er gamma med $\alpha = \nu/2$ og $\beta = 2$.

Kjikvadrat fordelingen (forts.)

Forventing og varians i kji-kvadrat fordelingen er

$$\mu = E(X) = \nu \quad \sigma^2 = \text{Var}(X) = 2 \cdot \nu$$

