

- Sjå på eit utval av ofte brukte diskret sannsynsfordelingar
  - Binomisk
  - Multinomisk
  - Hypergeometrisk
  - Geometrisk
  - Negativ binomisk
  - Poisson
- Prosesserar desse beskriv
  - Bernoulli prosess
  - Poisson prosess
- Nokre eigenskapar
  - $E(X)$  og  $Var(X)$

## Diskret stokastisk variabel

Eit stokastisk variabel som gjev eit endeleg eller tellbart antall utfall.

### Diskret

Paret  $(x, f(x))$  blir kalla sannsynsfordelinga til den diskret stok. var.  $X$  dersom

- $0 \leq f(x)$
- $\sum_{\forall x} f(x) = 1$  (summen over alle mogelege  $x$ )
- $f(x) = P(X = x)$

### EKSEMPEL Terningkast

$x$	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/6$

## Definisjon 3.5

Den *kummulative fordelinlgsfunksjonen*  $F(x)$  for ein stok. var.  $X$  er:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- *Diskret:*  $F(x) = \sum_{t \leq x} f(t)$
- *Kontinuerleg*  $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

## Definisjon 4.1

La  $X$  vere ein stok.var. med sannsynsfordeling  $f(x)$ .

Forventningsverdien til  $X$  er då

$$\mu = E(X) = \sum_{\forall x} xf(x)$$

dersom  $X$  er diskret.

## Definisjon 4.3

La  $X$  vere ein stok. var. med forventning  $\mu$ . Variansen til  $X$  er då:

For diskret  $X$ :

$$Var(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_{\forall x} (x - \mu)^2 f(x)$$

## Teorem 4.2

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$



# Diskret uniform fordeling (ikkje pensum)

## Definisjon, diskret uniform fordeling

Dersom den stokastiske variabelen  $X$  tar verdiane  $x_1, x_2, \dots, x_k$  med likt sannsyn, er  $X$  diskret uniformt fordelt, og har sannsynsfordeling

$$f(x; k) = \frac{1}{k}$$

# Diskret uniform fordeling (ikkje pensum)

## Definisjon, diskret uniform fordeling

Dersom den stokastiske variabelen  $X$  tar verdiane  $x_1, x_2, \dots, x_k$  med likt sannsyn, er  $X$  diskret uniformt fordelt, og har sannsynsfordeling

$$f(x; k) = \frac{1}{k}$$

## Forventning og varians

Forventning og varians til ein diskret uniformt fordelt stokastisk variabel med sannsynsfordeling  $f(x; k)$  er:

$$\mu = E(X) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

$$\sigma^2 = Var(X) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2$$



# Diskret uniform fordeling (ikkje pensum)

## Definisjon, diskret uniform fordeling

Dersom den stokastiske variabelen  $X$  tar verdiane  $x_1, x_2, \dots, x_k$  med likt sannsyn, er  $X$  diskret uniformt fordelt, og har sannsynsfordeling

$$f(x; k) = \frac{1}{k}$$

Uniform sannsynsmodell  $\Rightarrow$  diskret uniform sannsynsfordeling.

## Bernoulli prosess

- ①  $n$  uavhengige forsøk
- ② Kvart forsøk resulterer i suksess,  $I_i = 1$  eller ikke-suksess  $I_i = 0$ .
- ③ Suksess-sannsynet  $p = P(I_i = 1)$  er konstant.

## Binomisk fordeling

Ser på antall suksess i ein Bernoulli prosess,  $X = \sum_{i=1}^n I_i$ .  $X$  er då binomisk fordelt;

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

# Binomial-koeffisienten (teo 2.6)

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Antall moglege kombinasjonar dersom ein trekker  $x$  individ frå ein populasjon på  $n$ , *utan tilbakelegging*, og når ein ikkje bryr seg om ordninga (rekkefølgje dei er trekt i), dvs *uordna*.

## Multinomisk prosess

- ①  $n$  uavhengige forsøk
- ② Kvart forsøk resulterer i ein av  $R$  kategoriar
- ③ Suksess-sannsynet  $p_i = P(\text{forsøk i gjev kategori } r)$  er konstant.

## Multinomisk fordeling

Ser på talet på utfall i kategori  $r$  i ein Multinomisk prosess.  $X$  er då multinomisk fordelt;

$$f(x_1, x_2, \dots, x_R; n, p_1, p_2, \dots, p_R) = \binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_R} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_R^{x_R}$$

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Antall moglege kombinasjonar dersom ein trekker  $x$  individ frå ein populasjon på  $n$ , *utan tilbakelegging*, og når ein ikkje bryr seg om ordninga (rekkefølgje dei er trekt i), dvs *uordna*.

## Multinomial koeffisient (teo 2.5)

Tilsvarende for  $r$  ulike grupper ('av suksess').

$$\binom{n!}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

der  $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$ .

- Urne med  $N$  kuler.
- $k$  blåe kuler (suksess)
- $N - k$  røde kuler (ikkje-suksess)
- Trekker  $n$  kuler
- $X$  er antall av dei trekte som er blåe (suksess).

## Definisjon hyper-geometrisk

$$f(x; N, n, k) = h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Studieprogram har  $N = 50$  studentar.  
For eller i mot obligatorisk øving?  
Nok å sprørje 10?

# Spørjeundersøking i studieprogram

Studieprogram har  $N = 50$  studentar.

For eller i mot obligatorisk øving?

Nok å sprørje 10?

Kva om  $k = 20$  er for og  $N - k = 30$  er i mot?

La  $X$  vere antal av dei 10 som er for. (I Matlab, M=50, K=20, N=10)

Kva er  $P(X \geq 5) = ?$

## Teorem 5.3

Dersom  $X$  er hyper-geometrisk fordelt:  $h(x; N, n, k)$ , så er forventningsverdien

$$E(X) = \mu = \frac{nk}{N}$$

og variansen

$$Var(X) = \sigma^2 = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{k}{N} \cdot \left(1 - \frac{k}{N}\right)$$